

## 塩酸バンコマイシン散水溶液

塩酸バンコマイシン散	0.5g	
単シロップ	4mL	…VCM 自体が強烈的な苦味があり味の補整のため添加
注射用水	溶解	
	全量	20m L

### (調製法)

- ① 塩酸バンコマイシン (VCM) 散 500mg 1 Vを 10mL の注射用水で溶解して投薬ビンに入れる。単シロップは VCM 散 1V に対し 4mL を加える。
- ② その後、注射用水で希釈し全量を 20m Lにする。
- ③ 調製は 7 日又は 8 日分を調整し払い出す

(適応) C D感染治療

**基本：V C M水溶液は VCM500mg (1 V) を 20m L で溶解調製している**

**そのため、1 回の服用量は以下のようなになる**

- (用法・用量)
- 1 回 125mg (1/4 V) は 5m L を内服
  - 1 回 250mg (1/2 V) は 10m L を内服
  - 1 回 500mg (1 V) は 20m L を内服

(保存) **溶解後は冷所保管、使用期限は 9 日間**

### 備考

#### 少量長期投与方法例

500mg/日 1日4回 7日間

250mg/日 1日2回 8日間

125mg/日 1日1回 8日間

125mg/2日 2日に1回 4回分 (8日間) 合計：31日間

### 去痰用吸入薬

ビソルボン吸入液 25mL

生食 225mL

---

250mL

混合調製する

褐色投薬ビンで調製

冷所保管 開封後 1 週間の期限

### 喘息用吸入液

メプチン吸入液 10mL

ビソルボン吸入液 25mL

生食 215mL

---

全量 250mL

混合調製する

褐色投薬ビンで調製

冷所保管 開封後 1 週間の期限

### 小児用吸入液

メプチン吸入液 2mL

ビソルボン吸入液 10mL

生食 88mL

---

100mL

混合調製する

褐色投薬ビンで調製

冷所保管 開封後 1 週間の期限